КАКОЕ ПСИХОАКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО УПОТРЕБЛЯЕТ ВАШ ПОДРОСТОК

Тип психоактивного вещества	**Героин и другие опиаты**	**Марихуана**	**Кокаин и другие психостимуляторы**	**Галлюциногены**	**Растворители и клей**
Способ употребления	Инъекционный путь или вдыхание, курение, втирание в слизистые полости рта	Курение.	Вдыхание через нос (кокаин); курение (кокаин, крэк); инъекции (первитин)	Помещаются под язык для рассасывания.	Вдыхание паров. Характерно для раннего подросткового возраста.
Предметы, связанные с употреблением наркотика	Шприцы, иглы и упаковки от них; вощёные бумажки; фольга; закопченные столовые ложки	Пустые папиросные гильзы; табак; фольга; бумага для самокруток;	Соломинки; самодельные трубочки из фольги или вощёной бумаги; аптечные весы; эфир, нашатырь, сода.	Мелкие квадратики фильтровальной бумаги; редко таблетки, капсулы, раствор-гель.	Тюбики, банки с препаратами бытовой химии, смоченные тряпки, целлофановые пакеты с резким запахом
Внешние признаки	Следы уколов; кожа бледная, сухая и тёплая; зрачок узкий, плохо расширяется в темноте; частота пульса снижена; малая чувствительность к физической боли. На стадии абстиненции признаки, напоминающие простуду: насморк, озноб, тошнота, боль в животе, возможны рвота и понос; судороги.	Бледность кожных покровов, покраснение и отёк глазных яблок, склер и век; слезящиеся, «стеклянные» глаза; расширение зрачка, его замедленная реакция на изменение освещения; покраснение губ; сухость во рту; учащение пульса; повышение давления; сладковатый запах от одежды. При постоянном употреблении характерно пониженное давление;	Бледность кожных покровов; сухость во рту; учащённый пульс; расширенные зрачки; озноб; дрожь; потливость; понос; неуверенные движения; нарушенная координация. При применении эфедрина гладкий, отёчный, красный язык.	Повышение температуры и давления; расширение зрачков.	Мутные глаза, отёчное лицо, серовато-землистый оттенок кожи, ломкость волос и ногтей, запах растворителя от одежды.

		замена мышечной ткани жировой.			
Эмоционально-поведенческие признаки	Излишняя общительность; эйфория; бодрость; нарушение ритма сна; частые смены настроения; рассеянность и задумчивость. В период ломки: беспокойство, нервозность, повышенная раздражительность; вспыльчивость; агрессия; поиск повода для отлучек из дома.	Активность, подвижность, суетливость; сбивчивая, торопливая речь; повышенная весёлость; «волчий» аппетит. Через несколько часов смена настроения на прямо противоположное: агрессия, вспыльчивость, беспричинная тревога; страхи.	Оживление; невозможность усидеть на одном месте; деятельность, лишённая смысла; непоследовательность в действиях; неспособность слушать другого и быстрые, скачущие мысли. На стадии абстиненции пассивность; раздражительность; депрессии; тревожная мнительность; мания преследования; галлюцинации.	Странность восприятия предметного мира, его «одушевление»; изменение цветовосприятия; плавная замедленность движений; беседы с самим собой; замедленная речь и реакция на внешние раздражители; нарушение ориентировки во времени и пространстве; незаметная ранее склонность к мистицизму.	Невнятная смазанная громкая речь, шаткая походка, активная жестикуляция. Состояние напоминает алкогольное опьянение. Всплески агрессии; галлюцинации («мультяшки»). Через несколько часов вялость, сонливость, жалобы на усталость, снижение успеваемости в школе.